

Extracts from pages 111, 148 and 149 of “Description des Champignons de l’Herbier du Muséum de Paris”, by J.-H. Léveillé; *Annales des Sciences naturelles*, 3ème série, *Botanique*, v. 5, 1846: 111 – 167.

[*Note.* Léveillé consistently spells F. W. Ludwig Leichhardt’s surname as “Leichkardt”.]

LÉVEILLÉ . — CHAMPIGNONS DU MUSÉUM DE PARIS 119

DESCRIPTION DES CHAMPIGNONS
DE L’HERBIER DU MUSÉUM DE PARIS;

Par J.-H. LÉVEILLÉ, D. M.

L’Herbier général du Muséum d’histoire naturelle de Paris, qui n’a cessé de s’augmenter depuis un demi-siècle, à partir de l’époque où cet établissement reçut l’organisation qu’il conserve et qui le porte chaque jour à un plus haut degré de splendeur, ne paraît pas néanmoins avoir toujours suivi le même accroissement dans les différentes branches qui le composent. Ainsi la Cryptogamie et surtout la famille des Champignons, étrangère en grande partie aux études spéciales des anciens professeurs de cet établissement, se trouva longtemps négligée, et ce n’est en réalité que dans ces dernières années qu’on la voit mériter enfin une attention particulière et recevoir une impulsion toute nouvelle des deux professeurs qui dirigent actuellement les collections botaniques.

Aujourd’hui les matériaux ne manquent pas ; . . .

. . .





...

157. *Thelephora* (stereum) *hirsuta*, Willd. — Hab. ad cortices, Chili. Cl. Gay. Nouvelle-Hollande. Leichkardt (herb. Mus. Par.).

158. *Thelephora* (stereum) *versicolor*, Swartz.. — Hab. ad truncos, Vera-Cruz, Mexico, Galeotti, n° 6854 (herb. Mus. Par.).

150. *Thelephora* (stereum) *Leichkardtiana*, nov. sp. Pileo co- [→]

riaceo applanato poslice attenuate zonato spongioso-velutino fulvo margine tenui integro postice inflexo, hymenio glaberrimo pallide flavo. — Hab. Nova-Hollandia ad truncos, circa Morton-Bay. Leichhardt (herb. Mus. Par.).

OBS. Espèce très consistante, ferme, à chapeau plat, creux en dessous et en arrière. Il est marqué de quelques zones et recouvert d'un duvet feutré, fauve, qui ressemble à une éponge. L'hyménium est glabre et légèrement jaune.

160. *Thelephora* (stereum) *fulva*, nov. sp. Pileo coriaceo membranaceo applanato sessili zonato-sulcato hirsuto fulvo, margine tenui pallidiori, hymenio rugoso concentricè sulcato nudo postice fulvo antice dilutori. — Hab. ad truncos, Caput Bonæ Spei. Drege. n° 9441 (herb. Mus. Par.).

OBS. Chapeaux larges de 2 à 4 centimètres; par les côtés, ils sont membraneux, flexibles, d'une couleur fauve, avec des sillons transverses et recouverts d'un duvet épais. La face inférieure porte l'empreinte du sillon de la face supérieure; elle est inégale, nue, d'un fauve foncé en arrière et pâle à la marge.

161. *Thelephora* (stereum) *pulverulenta*, nov. sp. Pileo coriaceo reflexo suborbiculari postice attenuate depresso tomentososo ferrugineo-fusco zonis tenuissimis notato, margine tenui undulato, hymenio inæquabili fulvo pulverulento, contextu concolori. — Hab. ad truncos, Caput Bonæ Spei. Drège, n° 9142 (herb. Mus. Par.).

OBS. Chapeaux membraneux, flexibles, aplatis, déprimés en arrière, tomenteux et marqués de zones concentriques très fines. L'hyménium est remarquable par la poussière fauve qui le recouvre.

...